

PRÉPARATION POUR LES EXAMENS MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP

FAX	TÉL.	EXAMEN	NPO	VOIE IV	BILAN SANGUIN	CONS.	ANEST.	PARTICULARITÉS	GÉNÉRALITÉS
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE</b>									
55548	23169	<b>BREATH TEST</b>	6h avant					Jeûne strict/pas H2O pas de gomme, pastille ou bonbon Pas d'anti-acide 48h avant/ pas médicament famille des -prazole 14 jours avant / pas de bismuth ou antibiotique 30 jours avant / prévoir 45 min	
		<b>GANGLION SENTINELLE</b>						Prévoir 3h / Aucune préparation	<b>Transport :</b> Usager en jaquette sans bouton pression sur civière ou en fauteuil roulant, <u>seulement si se mobilise bien seul.</u>
		<b>HIDA (VOIES BILIAIRES)</b>	6h avant	BS # 18-20*				Prévoir 6h, noter le poids, heure et contenu du dernier repas	
		<b>MIBI-REPOS JOUR 1</b>	4h avant	BS # 18-20*				24h avant diète MIBI** /après injection, repas (gras si possible) avant photos 1h30 post injection iv	
		<b>MIBI-PERSANTIN JOUR 2</b>	4h avant	BS # 18-20*				48h avant diète MIBI**/ pas de timbre de nitro et faire prendre les pompes pulmonaires à l'usager asthmatique le matin/après injection repas (gras si possible) avant les photos 1h30 post injection iv	<b>LÉGENDE :</b> <b>*VOIE IV :</b> Enlever pompe si possible. Aucun soluté avec additif. Si soluté en cours; mettre rallonge. Power Picc Line OK pour tous les examens <b>**DIÈTE MIBI:</b> pas de thé, café, chocolat, boisson gazeuse ou énergétique, atazol-30
		<b>MIBI-EFFORT JOUR 2</b>	4h avant	BS #18-20*				Souliers confortables pour faire un tapis roulant/ après injection repas (gras si possible) avant les photos 1h30 post injection iv	
		<b>OSSEUSE</b>		BS # 18-20*				Prévoir entre 3 et 6 heures.	
		<b>OSSEUSE ET GALLIUM</b>		BS # 18-20*				Suite à osseuse, injection de gallium/48h post injection iv mise en images	<b>**Téléavertisseur contacter l'appel général</b>
		<b>POUMONS V/Q (VENTILATION ET PERFUSION PULMONAIRE)</b>		BS # 18-20*				Examen URGENT à faire le jour même sauf si examen de contrôle ou spécifié par le md ** fin de semaine et jour férié signaler le technologue de garde	
		<b>RÉNOGRAMME MAG-3 DE BASE</b>		BS # 18-20*				Boire 500cc H2O/ omettre hypotenseur et diurétique le matin/avec accord du md prévoir 1h	
		<b>MAG-3 CAPTOPRIL</b>	4h avant	BS # 18-20*				Boire 500cc H2O/ omettre hypotenseur et diurétique le matin /avec accord du md Prévoir 3h	
		<b>MAG-3 LASIX</b>		BS # 18-20*				Boire 500cc H2O/ omettre hypotenseur et diurétique le matin /avec accord du md Prévoir 3h	
		<b>VENTRICULOGRAFIE ISOTOPIQUE</b>		BS # 18-20*				Aucune préparation/ Prévoir 2h	
<b>VIDANGE GASTRIQUE</b>	5h avant					Pas fumer 5h avant l'examen/ pas de médication gastro-intestinale le matin/peut prendre ses médicaments avant le repas de l'examen. (diabétique)*** Prévoir 5h	<b>***Allergie ou intolérance alimentaire :</b> <i>Gluten, Œuf</i>		
<b>THYROÏDE</b>		BS # 18-20*	T3 T4 TSH			<b>Jour 1 :</b> cessé synthoïd 4 à 6 sem. avant/ cessé cytomele 2 sem. avant/cessé tapazol, propylthiuracile 3 à 5 jours avant avec accord du md. Prévoir 1h  <b>Jour 2 :</b> rencontre avec le nucléiste après examen/ prévoir 1h Pas injection de C+ (produit de contraste iodé) dans les 3 mois avant			

PRÉPARATION POUR LES EXAMENS MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP

FAX	TÉL.	EXAMEN	NPO	VOIE IV	BILAN SANGUIN	CONS.	ANEST.	PARTICULARITÉS	GÉNÉRALITÉS
<b>TEP</b>									
55548	23169	<b>TEP ONCOLOGIE NEUROLOGIQUE INFECTION</b>	6h avant	BS # 18-20* <b>Du côté opposé à la lésion</b>	Glycémie Capillaire			Pas de gomme, bonbon, de pastille ni de menthe ne pas fumer. Aucun rafraîchisseur d'haleine ni de sirop contre la toux/médicaments habituels <b>permis uniquement avec de l'eau sauf usager diabétique</b> . Aucun soluté ou dialyse péritonéale contenant GLUCOSE OU DEXTROSE 6h avant. Mesurer la glycémie 1h avant l'examen, aviser la médecine nucléaire si $\geq 14\text{mmol/L}$ . pour les patients <b>diabétiques : ne pas prendre la médication pour le diabète le AM de l'examen et pas d'insuline 6h avant.</b>	
		<b>TEP PÉRICARDIQUE</b>	12h avant	BS # 18-20*	Glycémie Capillaire			24h avant l'examen diète : Dîner œuf+ steak /souper œuf+steak+2c.à soupe d'huile végétale. <b>UNIQUEMENT</b> eau permise en tout temps.  2h avant l'examen donner 2 c.à soupe d'huile végétale.  Pas de gomme, bonbon, de pastille ni de menthe ne pas fumer. Aucun rafraîchisseur d'haleine ni de sirop contre la toux/médicaments habituels <b>permis uniquement avec de l'eau sauf usager diabétique</b> . Aucun soluté ou dialyse péritonéale contenant GLUCOSE OU DEXTROSE 6h avant. Mesurer la glycémie 1h avant l'examen, aviser la médecine nucléaire si $\geq 14\text{mmol/L}$ . pour les patients <b>diabétiques : ne pas prendre la médication pour le diabète le AM de l'examen et pas d'insuline 6h avant.</b>	
		<b>TEP VIABILITÉ</b>	12h avant	BS # 18-20*	Glycémie Capillaire			Pas de gomme, bonbon, de pastille ni de menthe ne pas fumer. Aucun rafraîchisseur d'haleine ni de sirop contre la toux/médicaments habituels <b>permis uniquement avec de l'eau sauf usager diabétique</b> . Aucun soluté ou dialyse péritonéale contenant GLUCOSE OU DEXTROSE 6h avant. Mesurer la glycémie 1h avant l'examen, aviser la médecine nucléaire si $\geq 14\text{mmol/L}$ . pour les patients <b>diabétiques : ne pas prendre la médication pour le diabète le AM de l'examen et pas d'insuline 6h avant.</b>	

Liste des abréviations du tableau

Anest	Anesthésie
BS # 18-20	Bouchon salin et jelco # 18 ou 20
C+	Avec substance de contraste
Cons	Consentement AH-110
H2O	Eau
NPO	Nil per os (rien par la bouche)
Voie IV	Voie intraveineuse