

Alimentation progression dysphagie

selon les formulaires dysphagie « *outil de dépistage – clientèle AVC* » et
« *outil de dépistage – clientèle AVC et post extubation – unité des soins intensifs* »

Outil destiné aux techniciennes en diététique

- **À l'urgence**, l'infirmière doit indiquer manuellement les changements d'alimentation dans [Medurge](#).
- **Aux unités**, [l'infirmière contacte plutôt la technicienne en diététique](#) pour modifier l'alimentation progressivement.

Alimentation Progression Dysphagie

Dysphagie 1 : purée régulière, liquide clair, sans multiphase

Dysphagie 2 : hachée, liquide clair, sans multiphase

Dysphagie 3 : molle, liquide clair, sans multiphase

Dysphagie 4 : tendre, liquide clair, avec multiphase

- Si l'utilisateur tolère bien l'alimentation en cours, sans signe de dysphagie relevé, l'alimentation doit être progressée jusqu'à ce que l'utilisateur atteigne l'alimentation dysphagie 4 (dysphagie 1 à 2, 2 à 3, etc.) à raison d'une progression par repas, si possible. [L'infirmière avisera la technicienne en diététique de l'ajustement de la diète.](#)
- Si des signes de dysphagie sont relevés ou que la condition de santé de l'utilisateur fluctue, [l'infirmière avise la technicienne en diététique afin de revenir aux textures du repas précédent.](#)